

โรคพิษสุนัขบ้า

สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชื่อ วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อพิษสุนัขบ้า

ที่ตายแล้ว และนี่ก่อให้เกิดโรค วัคซีนนี้สามารถให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเมื่อถูกกัดหรือที่มีเชื้อโรคนี้กัด วัคซีนนี้มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันโรค หากฉีดได้ครบตามกำหนด

ใครควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

และจะต้องฉีดกี่ครั้ง อย่างไร

การให้วัคซีนชนิดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีอยู่ 2 แบบ คือ

1. การให้เพื่อป้องกันก่อนได้รับเชื้อ (ก่อนถูกสัตว์กัด)

ควรพิจารณาให้แก่ สัตว์แพทย์ สัตวบาล เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมการพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปในพื้นที่เป็นแหล่งของโรคนี้ ควรจะได้รับวัคซีนชนิดนี้เช่นกัน โดยจะต้องฉีด 3 เข็ม ที่วันที่ 0, 7 และ 21 หรือ 28

2. การให้วัคซีนหลังจากได้รับเชื้อ (หลังจากถูกสัตว์กัด)

บุคคลใดก็ตามที่ถูกกัดโดยสัตว์หรืออาจสัมผัสกับไวรัสพิษสุนัขบ้า ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ และควรจะไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อทำแผลและให้วัคซีน

หากผู้ที่ยังไม่เคยได้รับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนจำนวน 5 เข็ม โดยฉีดเข็มแรกให้เร็วที่สุด และเข็มต่อมาในวันที่ 3, 7, 14 และ 28 หลังเข็มแรก

นอกจากนี้ แพทย์อาจพิจารณาให้วัคซีนอินทิโมโนกลอบูลินเพื่อช่วยเสริมการป้องกันโรคด้วย

หากผู้ที่ยังไม่เคยได้รับ วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแล้วมานานกว่า



6 เดือน ควรจะได้รับวัคซีนอีกจำนวน 2 เข็ม

โดยฉีดเข็มแรก ให้เร็วที่สุด และอีกเข็ม

ในวันที่ 3 หลังจากเข็มแรก หากเคยได้มาก่อน



เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ช่วย ต้องทำอะไรบ้าง



1 ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้งให้ถึงกับแผล ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง **ใส่ยา**รักษาแผลสด



2 งดว่าสัตว์กัดที่ติดเพื่อสับหาเจ้าของ/กักหมา ไว้ดูอาการ 10 วัน สอบถามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



3 ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกันทุกข้อ

เมื่อถูกสัตว์野生ช่วยด้วยวิธีโรคพิษสุนัขบ้าที่กัดหรือข่วน

ต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา 10 วัน และหาหมอ




องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ็ง

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวหมา



ป้องกันได้ด้วยวัคซีนทั้งในคนและในสัตว์



075518522